

7月は分園、本園の乳児クラスでRSウイルス感染症をはじめ、爆発的に病気が流行してしまいました。保健所からの情報ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年は自粛強化されていたため、ほとんどRSウイルス感染症の流行は見られていなかったそうです。今年は昨年ほどの自粛状況がうすいことも関連するのか、今年は乳児にRSウイルス感染症が大流行してしまったようです。RSウイルスは乳児が感染すると肺炎や喘息など、重症化しやすくなるため注意が必要です。すべての感染対策として、外出後の手洗いやうがいを徹底し、アデノウイルス感染症の眼症状がある場合は、タオルなどの共有は避け、注意をしていきましょう。

# 7月感染症情報

## 本園

- 咽頭結膜熱（プール熱） 5名
- 流行性角結膜炎（はやり目） 1名
- RSウイルス感染症 4名
- 突発性発疹 1名
- 手足口病 2名
- アデノウイルス感染による咽頭炎・熱 2名

アレルギー性結膜炎含む急性結膜炎症状のあったお子さんは、乳児クラスにて10名以上いました。



## 分園

- RSウイルス感染症 9名



しっかり手洗い  
しよう!!

## おねがい

登園前に目の充血やなみだ目、目ヤニが多い等の症状がみられましたら、**登園前に眼科受診を必ずしてください。**アデノウイルス感染による眼症状の場合、感染力が強いため、登園停止となります。

感染リスクがないことを医師と確認したうえで登園していただきますよう、ご協力お願い致します。

万が一、病院受診をされていなかった場合、園では感染しやすい(流行性角結膜炎などの)症状なのか判断が出来ないため、お子さんをお預かりすることが難しくなります。

また治療中に諸症状が悪化した場合も再度受診をしていただき、お子さんの為に早めの対処をしていただきますよう、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い致します。



## 流行性角結膜炎について\*医師の「意見書」が必要になる疾患です

### ★症状★

目の充血、目ヤニや涙が大量に出たり、異物感（目がゴロゴロする）を生じたりします。瞼（まぶた）が腫れ、ひどい場合は目が開かなくなります。

炎症が角膜にまで及ぶと角膜まで濁ってしまい、数年間視力障害が残ることがあります。

症状は両目に出ることが多く、片目だけ発症した場合でも数日後にもう片方の目に症状が出る場合があります。

また、眼以外の症状として耳の前方にあるリンパ節が腫れるのも一つの特徴です。



### ★発症★

アデノウイルスに感染することで発症します。

ウイルス感染後、8日～14日程度の潜伏期を経た後に発症します。

### ★感染経路★

接触感染です。病原ウイルスによって汚染されたティッシュペーパー、タオル、洗面器などに触れることで感染します。従って、他の人に感染を広げないためには手洗いや消毒の徹底が必要です。タオルなど目に触れる可能性があるものはまだ感染していない家族とは別にしたり、お風呂は最後に入るようにしましょう。なお、1ヶ月程度は便の中にウイルスが排泄されることがあるため、症状が落ち着いてもこまめに手洗いをするのが大切です。



## 幼児クラスで手洗い チェックをしました

クラスごとに手洗いの仕方と、マスクの正しいつけ方について、お話とチェックをさせていただきました。

どんな時に手を洗えばいいのか、わかるかな?の質問に、「お外から帰ってきたとき～」「おやつを食べるとき」「おトイレしたあと」と手洗いの必要な場面を教えてくださいました。

マスクは、息苦しさもあるのか、お鼻が出てしまっているお子さんもいましたが、マスクはバイ菌から鼻と口を守ってくれることを伝えると、お鼻までマスクをしてくれました。マスクのサイズが小さい、耳のゴムがゆるい等、サイズの合わないお子さんもいましたので、いま一度マスクのサイズ確認もしてみてください。

## 8月の保健行事

### \*乳児健診日程変更のお知らせ\*

8月11日(水)に実施予定でした乳児健診ですが、医師の都合により、8月4日(水)に変更になりました。

それに伴い、前回お知らせしていましたが身体測定の日程が一部変更しています。下記の日程を再度確認して下さい。

よろしくお願い致します。

2日(月) 身体測定(幼児・分園)

3日(火) 身体測定(ゆめ・つき)

4日(水) 乳児健康診断(ゆめ・ひよこ)

5日(木) 身体測定(ほし)